

TILMICOSINA ENSOL 20 HS

(Antimicrobiano / Antibiótico – Macrólido)

Activo	Concentración
Tilmicosina (como fosfato)	20 g
Excipiente c.s.p.	100 g

Indicaciones de uso:

Antibiótico macrólido utilizado en porcinos y pollos parrilleros en el alimento y agua de bebida para el tratamiento de afecciones del tracto respiratorio.

Actúa sobre micoplasmas, numerosas bacterias G+ y algunas bacterias G-: *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma dispar*, *Mycoplasma bovirhinis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Actinomyces pyogenes*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Erysipelothrix rhusopathiae*, *Moraxella bovis*, *Costridium perfringens*, *Fusobacterium necrophorum*.

Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios, alimentos completos o en el agua de bebida.

Especies y categorías de animales para los que se indica:

Aves: pollos parrilleros, pollas de reposición y reproductores; porcinos.

Forma de administración:

Para lograr una dosificación segura del producto en el alimento, se sugiere realizar una correcta homogenización y mezclado del mismo, siguiendo las siguientes instrucciones:

La dosis completa del producto necesaria para preparar una tonelada de alimento medicado, se adiciona a 5 kg de alimento molido o a un ingrediente de granulometría y densidad similar. Se mezcla en un recipiente limpio y seco hasta lograr una completa homogenización de los componentes. Esta mezcla obtenida, se adiciona a otro ingrediente, se mezcla hasta homogeneizar, repitiendo sucesivamente este procedimiento con cada uno de los componentes de la ración, hasta la completa dispersión de todos los ingredientes.

Para su uso en el agua de bebida, disolver con agitación, la dosis completa calculada para preparar el volumen total de agua de bebida consumida por los animales durante un día, en un recipiente de menor volumen; una vez disuelta, se trasvasa al tanque de agua general y se agita para su homogeneización.

Dosificación y duración del tratamiento:

Comercial:

Juana Manso 1750 "Edificio Esmeralda" Piso 8° C y D/ Complejo ZenCity
Puerto Madero (C1107CHJ) C.A.B.A. (011) 5368-7400



Especie/Categoría	Dosis de Tilmicosina (mg/Kg PV)	Dosis de Tilmicosina Ensol 20 (g/tn ración)	Dosis de TILMICOSINA ENSOL 20 (g/1000 l de agua de bebida)	Duración del tratamiento
Aves (pollos parrilleros; pollas de reposición; reproductores)	10 - 15	350 - 500	250 - 375	Continúa durante 5 días
Porcinos	10 - 20	1000 - 2000	870 - 1700	Continúa durante 10 a 21 días

Efectos adversos, contraindicaciones y precauciones:

No administrar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo.

No permitir el acceso al alimento con tilmicosina a los equinos por ser altamente tóxica en esta especie.

Homogeneizar adecuadamente las mezclas preparadas a partir del producto.

Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto del producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua.

Lavarse las manos luego de realizar la preparación.

No comer ni fumar durante la manipulación del producto.

En caso de vertido accidental, recoger los sólidos evitando la formación de suspensiones aéreas de polvo y eliminarlos como desperdicios en contenedores apropiados.

Manipular en lugares ventilados.

Se debe utilizar la preparación alimenticia inmediatamente después de que el producto ha sido incorporado y mezclado a la misma. Una vez que el producto ha sido mezclado con el alimento, éste debe utilizarse en un plazo no mayor a 7 días.

El agua de bebida medicada debe consumirse dentro del día de su preparación.

Restricciones de uso:

El período de retiro previo al sacrificio es de 14 días para aves y cerdos.

No administrar a gallinas ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

“Este producto no debe administrarse con fines de promoción de crecimiento, a animales productores de alimentos para consumo humano, cuyos productos y/o subproductos, incluidos leches, huevos y miel, se exporten a la Unión Europea y/o a otros países con requisitos equivalentes”.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado y a resguardo de la luz solar.

Conservar entre 5 y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.



Comercial:

Juana Manso 1750 "Edificio Esmeralda" Piso 8° C y D/ Complejo ZenCity
Puerto Madero (C1107CHJ) C.A.B.A. (011) 5368-7400

División Veterinaria de ENSOL S.A.

ENSOLVET

SANIDAD ANIMAL

Presentación: Bolsas de 10 Kg y Potes de 0.4KG
Vida Útil: En su envase original cerrado se conserva por 2 años
Inscrip. SENASA: N° 12-186

Comercial:

Juana Manso 1750 "Edificio Esmeralda" Piso 8° C y D/ Complejo ZenCity
Puerto Madero (C1107CHJ) C.A.B.A. (011) 5368-7400

www.ensolvete.ensolsa.com/

