

ENSOL-BAC 15% PX

(Antibiótico profiláctico. Promotor de crecimiento. Mejorador de la eficiencia alimenticia)

Activo	Concentración
Bacitracina de zinc	15 gr
Excipiente c.s.p.	100 gr

Indicaciones de uso:

Indicado para la prevención y tratamiento de infecciones uro-genitales, respiratorias y digestivas de las aves, bovinos y porcinos, causadas por organismos sensibles a la amoxicilina.

Espectro de Acción:

Posee una marcada acción bactericida sobre microorganismos Gram positivos y Gram negativos, tales como: Pasteurella spp., Bacillus anthracis, Brucella spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium spp., Streptococcus D, Haemophilus spp., Staphylococcus spp., Fusiformis spp., Clostridium spp, Streptococcus spp., Corynebacterium, Proteus spp., Salmonella spp., Terponema spp., Moraxella spp., Shigella spp., Escherichia Coli, Klebsiella spp., Pseudomona aeruginosa.

Características y Modos de Acción:

Inhibe la actividad de la enzima transpeptidasa y de otras enzimas peptidoglicano activas (carboxipeptidasas, endopeptidasas) - denominadas proteínas unidas a las penicilinas (PBPs) – que son las que catalizan el lincaje cruzado de las unidades de los polímeros de glicopéptidos que forman la pared celular de las bacterias. El paso final en la acción de estas drogas, probablemente involucra la inactivación de un inhibidor de las enzimas autolíticas de la pared celular. Ejercen una acción bactericida, causando la lisis sólo de las bacterias en crecimiento, es decir, en la fase en que éstas presentan síntesis de pared celular.

Administración:

La administración es continua durante 3 a 5 días.

Dosificación:

Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del producto será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

Comercial:

Juana Manso 1750 "Edificio Esmeralda" Piso 8° C y D/ Complejo ZenCity
Puerto Madero (C1107CHJ) C.A.B.A. (011) 5368-7400



Especie	Concentración de producto (g/Tn de alimento final)
Pollos	60 a 333
Pavos y Faisanes	27 a 333
Codornices	50 a 200
Cerdos	67 a 333

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso a trata

Precauciones, advertencias, restricciones y contraindicaciones:

No usar simultáneamente con la Neomicina ya que bloquea la absorción de las penicilinas orales. No usar conjuntamente con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana ya que pueden antagonizar la acción bactericida de las penicilinas. No administrar en animales que presenten septicemia, shock, deshidratación, debido a que disminuye significativamente la absorción del principio activo. No administrar a animales con el rumen funcional. Usar con precaución en hembras preñadas. No administrar a vacas lecheras en producción.

Período de Retiro:

Aves: período de retirada pre-faena: 1 día
 Bovinos: período de retirada pre-faena: 20 días.
 Porcinos: período de retirada pre-faena: 15 días.

Presentación: Bolsas de 25kg
Vida útil: En envase original cerrado se conserva por 2 años
Inscrip. SENASA: N° 11-172



Comercial:

Juana Manso 1750 "Edificio Esmeralda" Piso 8° C y D/ Complejo ZenCity
 Puerto Madero (C1107CHJ) C.A.B.A. (011) 5368-7400