



Alimento balanceado completo con medicamento.
Indicado para porcinos (lechones) desde la segunda (2da.) semana de vida hasta una (1) semana post-destete.

Ingredientes:

Maíz extrusado, suero de queso; arroz pulido; harina de soja micronizada; leche entera; poroto de soja extrusado; maíz colorado; plasma (bovino); lisina; fosfato monodivalente; óxido de zinc; sal; acidificante: ácido fosfórico, formiato de calcio, ácido cítrico, ácido fumárico; treonina; metionina; secuestrante de micotoxinas: aluminosilicatos, levaduras inactivadas, extracto de levaduras, componentes vegetales (*Cardus marianus*); núcleo vitamínico*; núcleo mineral**; butirato de sodio; bacitracina de zinc; triptofano; saborizante: dextrosa monohidrato, sacarina sódica, neoesperidina, taumatina, gama nonalactona, bencil-acetato, anisaldehído, benzaldehído, isoamil-acetato, etil-butirato, vainillina, aldehído cinámico, etil-heptanoato, 2-undecanona, gama-undecalactona, etil-caprilato, diacetilo, acetil-propiónico; manano-oligosacáridos; conchilla; amoxicilina; colistina; colina; antioxidante: BHT, BHA, etoxiquina; proteasas; fitasa. *vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina; **minerales: zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio.

Composición centesimal:

Proteína Bruta (mínimo): 18% /// Extracto Etéreo (mínimo): 4,5% /// Fibra Cruda (máximo): 2% ///
Minerales totales (máximo): 6% /// Calcio (mínimo): 0,6% (máximo): 1% /// Fósforo (mínimo): 0,4%
- (máximo): 0,7% /// Humedad (máximo): 8%.

Indicaciones de uso:

Ensolmix Fase 0, es un alimento balanceado completo destinado a lechones lactantes al pie de la madre, utilizado como primer alimento sólido y soporte de la lactancia (creep feeding), desde la segunda semana de vida hasta 1 semana postdestete. También se puede suministrar a lechones destetados precozmente. Puede ofrecerse como alimento seco tal como se presenta, o bien, preparado comuna papilla.

Advertencias y precauciones:

- Este producto contiene medicamentos veterinarios.
- Debe ser utilizado exclusivamente en la especie y categorías para las que se indica.
- No suministrarlo en casos de hipersensibilidad conocida.
- Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto del producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua.
- No comer ni fumar durante la manipulación del producto.

Restricciones de uso:

- El período de retiro mínimo previo al sacrificio es de 15 (quince) días.
- No administrar a gallinas ponedoras en producción.
- No administrar en vacas lecheras en producción.

Este producto no debe administrarse con fines de promoción de crecimiento, a animales productores de alimentos para consumo humano, cuyos productos y/o subproductos, incluidos leches, huevos y miel, se exporten a la Unión Europea y/o a otros países con requisitos equivalentes.

Condiciones de almacenamiento:

Se debe conservar el producto, dentro de su envase original cerrado, en un lugar higiénico, fresco, seco, ventilado y a resguardo de la luz. Manteniendo las condiciones de conservación indicadas, el producto debe consumirse preferentemente antes de los 3 meses desde su elaboración.