

# ENSOL - SAL 12%

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

<b>Activo</b>	<b>Concentración</b>
Salinomicina	12 gr
Excipiente csp	100 gr

## **Indicaciones de uso:**

Prevención y control de la coccidiosis en las aves (pollos de engorde, reproductores y pollas de reposición). Tratamiento de enteritis necrótica por *Clostridium* sp.

## **Espectro de acción:**

Es activo contra los coccidios patógenos del género *Eimeria* spp., tales como *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mitis*, *Eimeria mivati*, causantes de severos perjuicios económicos. También actúa sobre *Clostridium* sp.

## **Características y modo de acción:**

El principio activo es una molécula ionófora, es decir, forma complejos con los iones, fundamentalmente sodio y potasio. Su mecanismo de acción se basa en esta propiedad, afectando el transporte de iones a través de la membrana del parásito que provoca un desbalance iónico y agota las reservas energéticas; y consecuentemente la muerte del mismo. Actúa sobre los esporozoítos y durante las primeras y últimas fases sexuales de los coccidios de las aves.

## **Administración:**

ENSOLSAL 12% se administra vía oral. Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos. Una vez dosificado debe mezclarse adecuadamente para garantizar la homogeneidad de la preparación. En pollos de engorde, la administración es continua hasta su retiro pre-faena; en pollas de reposición es continua desde el primer día de vida hasta las 16 semanas de edad.

## **Dosificación:**

333 a 500 g de ENSOLSAL 12% por Tonelada de alimento final.  
Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso a tratar

# ENSOL - SAL 12%

(Anticoccidianos / Coccidicidas)

**Precauciones, advertencias, restricciones, contraindicaciones:**

No administrar a gallinas ponedoras en postura de huevos para consumo humano, conejos, equinos y pavos. No asociar con tiamulina, oleandomicina, macrólidos y sulfas.

**Período de retiro:**

Respetando las indicaciones de uso, requiere un período de retiro pre-faena mínimo de 5 (cinco) días.

**Presentación:** Bolsas de 25kg

**Vida útil:** En envase original cerrado se conserva por 2 años

Inscrip. SENASA: N° 09-175