

ENSOLTILVA-T 5

(Antimicrobiano / Antibiótico / Macrólido)

Activo

Tilvalosina Tartrato
Excipiente c.s.p.

Concentración

5 g (equivalente a 4,2 gr de tilvalosina base)
100 gr

Indicaciones de uso

Antibiótico macrólido que actúa principalmente contra bacterias Gram positivas (Staphylococcus, Micrococcus, Microbacterium, Bacillus, Corynebacterium, Aerococcus, Arthrobacter and Streptococcus, Campylobacter, Enterococcus y Clostridium) y micoplasmas. Está indicado para el tratamiento de afecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal, causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina.

Cerdos: indicado para la prevención y el tratamiento de la Neumonía Enzoótica Porcina, la Ileítis (Enteropatía Proliferativa Porcina) y la Disentería Porcina; es activo frente a Mycoplasma hyopneumoniae, Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli.

Aves: indicado para la prevención y el tratamiento de las enfermedades respiratorias asociadas a la micoplasmosis; es activo frente a Mycoplasma gallisepticum.

Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios, alimentos completos o bien, disuelto en el agua de bebida.

Especies y categorías de animales para los que se indica

Porcinos y aves: pollos parrilleros, pollas de reposición, reproductores y faisanes.

Administración

Se administra por vía oral incorporado a las preparaciones alimenticias y /o agua de bebida.

Para lograr una dosificación segura del producto en el alimento, se sugiere realizar una correcta homogenización y mezclado del mismo, siguiendo las siguientes instrucciones:

La dosis completa del producto necesaria para preparar una tonelada de alimento medicado, se adiciona a 5 kg de alimento molido o a un ingrediente de granulometría y densidad similar.

Se mezcla en un recipiente limpio y seco hasta lograr una completa homogenización de los componentes. Esta mezcla obtenida, se adiciona a otro ingrediente, se mezcla hasta homogeneizar, repitiendo sucesivamente este procedimiento con cada uno de los componentes de la ración, hasta la completa dispersión de todos los ingredientes.

Para su uso en el agua de bebida, disolver con agitación, la dosis completa calculada para preparar el volumen total de agua de bebida consumida por los animales durante un día, en un recipiente de menor volumen; una vez disuelta, se trasvasa al tanque de agua general y se agita para su homogeneización.

ENSOLTILVA-T 5

(Antimicrobiano / Antibiótico / Macrólido)

Dosificación

Especie y categoría	Indicación de uso	Dosis de tilvalosina (mg/kg de PV)	Dosis de ENSOLTILVA T - 5 (cantidad/tn de ración)* **	Dosis de ENSOLTILVA T - 5 (cantidad/1000 litros de agua de bebida)* **	Duración de la administración
Aves (pollos parrilleros, pollas de reposición, reproductores y faisanes)	M - preventivo y curativo	25	4 a 12 kg	2 a 7,5 kg	Continúa durante 3 días consecutivos y ante situaciones de riesgo o estrés
Porcinos (todas las categorías)	NEP – preventivo	2,125	750 g a 1,6 kg	220 g a 650 g	Continúa durante 7 días consecutivos y ante situaciones de riesgo o estrés
	NEP - curativo	4,25	1,5 kg a 3,2 kg	450 g a 1,3 kg	Continúa durante 7 días consecutivos
	I (EPP) – curativo	4,25	1,5 kg a 3,2 kg	----	Continúa durante 10 días consecutivos
	I (EPP) – preventivo y curativo	5	----	530 g – 1,5 kg	Continúa durante 5 días consecutivos
	DP – preventivo y curativo	4,25	1,5 kg a 3,2 kg	----	Continúa durante 10 días consecutivos

*las dosificaciones se utilizarán en relación inversa al peso vivo de los animales; dentro del rango declarado, las dosis menores corresponderán a los mayores pesos vivos de los animales y viceversa.

**la dosificación del producto deberá ajustarse en función del consumo de alimento y agua de los animales.

Referencias: M: micoplasmosis; NEP: Neumonía Enzootica Porcina; I (EPP): Ileítis (Enteropatía proliferativa Porcina); DP: Disentería Porcina

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación y la duración del tratamiento, de acuerdo a las necesidades del caso a tratar.

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso a tratar.

Precauciones, advertencias, restricciones y contraindicaciones:

No administrar en casos de hipersensibilidad conocida a los principios activos. No administrar en animales con insuficiencia hepática o renal.

Homogeneizar adecuadamente las mezclas preparadas a partir del producto. / Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto del producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua. Lavarse las manos luego de realizar la

ENSOLTILVA-T 5

(Antimicrobiano / Antibiótico / Macrólido)

Lavarse las manos luego de realizar la preparación.

No comer ni fumar durante la manipulación del producto. / En caso de vertido accidental, recoger los sólidos evitando la formación de suspensiones aéreas de polvo y eliminarlos como desperdicios en contenedores apropiados. / Manipular en lugares ventilados. / Su inocuidad no ha sido determinada en animales en etapa reproductiva, en hembras preñadas o en lactación. / Luego de la preparación del alimento medicado, éste debe ser utilizado en el menor tiempo posible, dentro de un lapso máximo de 7 días. El agua de bebida medicada debe consumirse dentro del día de su preparación.

Restricciones de Uso

En aves y cerdos, el período de retiro previo al sacrificio para consumo humano, es de 2 días.

Presentación: Bolsas de 10kg

Vida útil: En envase original cerrado se conserva por 2 años

Inscrip. SENASA: N°16-078